


**UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA**



**FACTORES PREDISONENTES PARA NO REALIZARSE LA ESTERILIZACIÓN
QUIRÚRGICA EN MUJERES GRAN MULTIPARAS INTERNADAS EN UN
HOSPITAL DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO – 2017**

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE:

MÉDICO CIRUJANO

AUTOR: REIMER ORSON SAMANIEGO MOJICA

ASESOR: DR. GUSTAVO BASTIDAS PÁRRAGA

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: SALUD Y GESTION DE LA SALUD

FECHA DE INICIO: 01 JULIO DEL 2017

FECHA DE CULMINACIÓN: 31 MARZO DEL 2018

HUANCAYO – PERÚ

MARZO - 2018

RESUMEN

Objetivo: Determinar las características sociodemográficas, los antecedentes gineco-obstétricos, la percepción y los conocimientos previos asociados a no realizarse la esterilización quirúrgica en mujeres gran multíparas internadas en un hospital de la provincia de Huancayo **Materiales y Métodos:** Estudio de tipo descriptivo, prospectivo, de corte transversal, que se realizó a las mujeres gran multíparas hospitalizadas en los servicios de ginecología y obstetricia del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” de Huancayo que cumplieran con los criterios de inclusión. Se aplicó un instrumento de recolección de tipo encuesta. Se realizó una estadística descriptiva, así como, una inferencial que comprendió el análisis bivariado y multivariado. **Resultados:** Los factores estadísticamente significativos asociados a no realizarse la esterilización quirúrgica fueron: No haber utilizado ningún método anticonceptivo anteriormente (RPa: 1,35; IC 95%: 1,01-1,82; p: 0,042), no saber si desea tener más hijos (RPa: 1,58; IC 95%: 1,22-2,03; p <0,001), pensar que realizarse la esterilización quirúrgica iría en contra de sus derechos (RPa: 1,24; IC 95%:1,05-1,46; p: 0,008) y pensar que la esterilización quirúrgica produce alteraciones menstruales (RPa: 1,11; IC 95%:1,17-1,34; p: 0,027). Un 72,8% de las mujeres encuestadas no se realizaría la esterilización quirúrgica a futuro, sin embargo, a un 89,7% le gustaría recibir más información al respecto. **Conclusiones:** Un gran porcentaje de mujeres encuestadas no optaría por la esterilización quirúrgica a futuro debido a diversos factores, muchos de ellos modificables con una adecuada capacitación e intervención del personal de salud.

Palabras claves: Esterilización Tubaria, salud sexual y reproductiva, multiparidad ((Fuente: DeCS BIREME).