


UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad Ciencias de la Salud
Escuela Profesional de Odontología



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

**Título: RETENCIÓN SECUNDARIA EN DENTICIÓN DECIDUA
REPORTE DE UN CASO.**

Para optar el Título profesional de Cirujano Dentista

Autora :

NANCY YESSSENIA GUTIERREZ MAYTA

Área de Investigación..... Salud y Gestión de la Salud

Líneas de Investigación..... Investigación Clínica y Patológica

Huancayo – Perú

2020

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios que es la inspiración para realizar este
Caso clínico y terminarlo con mucha satisfacción.

DEDICATORIA

El presente caso clínico está dedicado a mis padres, gracias por todo

Y por su ayuda incondicional.

A mis docentes por guiarme por el sendero de la sabiduría.

INDICE

RESUMEN	5
II.-INTRODUCCIÓN.....	6
MARCO TEÓRICO.....	7
Retención secundaria:.....	7
DIENTES IMPACTADOS/RETENIDOS	7
RETENCIÓN PRIMARIA DE MOLARES TEMPORALES.	7
FALLO PRIMARIO DE ERUPCIÓN DE MOLARES TEMPORALES:	7
ENFERMEDADES SISTÉMICAS QUE INFLUYEN EN LA PERSISTENCIA DE LOS DIENTES TEMPORARIOS:.....	8
ALTERACIONES ENDOCRINAS.....	8
Hipohipofisismo.-	8
Hipotiroidismo.....	8
ALTERACIONES EN LA SECRECIÓN DE LAS HORMONAS SEXUALES.....	9
Pubertad Retrasada.....	9
ALTERACIONES METABÓLICAS	9
Cistinosis.....	9
PROGERIA (SÍNDROME DE HUTCHINSON – GILFORD)	9
DISPLASIA ECTODÉRMICA	10
CONTENIDO	11
DESARROLLO DEL CASO CLINICO	11
DISCUSIÓN.....	17
CONCLUSIONES	18
RECOMENDACIONES	19
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	20

RESUMEN

La retención secundaria en dentición mixta son uno de los pocos casos que se van a presentar en la trayectoria de la profesión pero que representa un análisis exhaustivo del caso de cómo debemos proceder a su tratamiento.

La retención dentaria en el proceso de erupción de los dientes temporales y permanentes es un hallazgo común que puede involucrar a cualquier diente en la arcada.

Según el momento eruptivo en que ocurre el fallo de la erupción se puede diferenciar, retención primaria o secundaria, como opciones terapéuticas ante una retención dentaria diferentes técnicas, en este caso se optó por la extracción

El objetivo de este caso clínico es determinar la técnica del procedimiento para poder retirarla retención secundaria en un niño de 9 años de edad que con el análisis de radiográfico se procedió a dicho tratamiento con buena evolución.

El odontólogo tiene que conocer la cronología de erupción dentaria para que pueda proceder al tratamiento indicado y las pruebas fundamentales son las radiografías como medida auxiliar para proceder a dicho tratamiento.

Palabras Clave: Retención secundaria, dentición mixta, placa panorámica, placa periapical, exodoncia.